

CS **Kolodium forte**



Před použitím si pozorně prostudujte návod k použití. Uchovajte si návod k použití pro případ dalšího použití.

Určeny účel: Zdravotnický prostředek Kolodium forte je určen k humánnímu použití u pacientů s postižením kůže (bradavice, kuří oka, zrohovatělá kůže) pro šetrné odstranění ztvrdlé, zrohovatělé kůže, kuřích ok a bradavic tak, že způsobuje odloučení vrchní zralé, rohové, plně keratinizované vrstvy kůže tzv. keratolytickým účinkem.

Složení: Alcohol, Acidum lacticum, Acidum salicylicum, Nitrocellulose, Chelidonium extractum fluidum, Thuya Occidentalis Extract, Ricinus Communis Oil, Terebinthinae etheroleum rectificatum, Ethyl Acetate.

Obsah léčivých látek v 1 g prostředku: Terebinthinae etheroleum rectificatum: 1,6 mg, Chelidonium extractum fluidum: 22 mg (přípravený z Chelidonium majus herba: 3,58 mg).

Zdravotnický prostředek neobsahuje deriváty lidské krve.

Charakteristika: Kolodium forte je přípravek ve formě roztoku pro lokální použití na postižená místa na pokožce. Jedná se o slabě zelenou viskózní kapalinu s charakteristickou vůní balenéu v lahvičce s uzávěrem, jehož součástí je špachtlička.

Kolodium forte obsahuje tyto léčivé látky:

Terebinthinae etheroleum rectificatum (terpentínová silice) je v prostředku použito v množství 0,16 % (w/w). Čištěná terpentínová silice z borovicové pryskyřky obsahuje terpeny pineny, camphen a limonen. Působí antisepticky, podporuje prokrvení tkáně, zvyšuje resorpci patologicky změněné tkáně a podporuje tvorbu granulací tkáně.

Chelidonium extractum fluidum je ethanoličský extrakt naté vlašovičnicku většího (Chelidonium majus). Je použitelný v množství 2,2 % (w/w). Vlašovičnick obsahuje vysoké množství alkaloidů (chelidolin, chelidoxanthin) a v lidovém léčitelství je používán jako prostředek na odstraňování bradavic. Alkaloidy mají při zevním užití antimikrobiální a antimitotické účinky.

Dále prostředek obsahuje **kolodium** (roztok nitrované celulózy ve směsi alkoholu), **kyselinu salicylovou a kyselinu mléčnou**. Tyto složky zajišťují šetrné rozrušení vrstvy tuhé, zbytnělé, hrubé kůže. Další jsou složky rostlinného původu: **thuja, ricinový olej**. Thuja obsahuje řadu monoterpénů (thujon, isothujon, fenchon, sabinen a alfa-pinen) a má tonizující účinky.

Indikace: Přípravek se používá k odstraňování ztvrdlé, zrohovatělé kůže, kuřích ok a bradavic.

Kontraindikace: Přípravek nelze používat, jestliže je pacient hypersenzitizován na kteroukoliv látku uvedenou ve složení přípravku. Přípravek se nesmí aplikovat na zdravou pokožku a sliznice, na bradavice v oblastech genitálu a konečníku a na mateřská znaménka.

Interakce: Interakce přípravku nejsou známy.

Nežádoucí účinky: V ojedinělých případech se jako nežádoucí účinek může vyskytnout pálení v místě aplikace, případně při nanesení na zdravou pokožku může dojít k jejímu podráždění.

Dávkování a způsob aplikace: Aplikuje se dle velikosti postiženého místa, obvykle v množství 1–3 kapky 2 krát denně. Nanášíme nejlépe špachtličkou na uzávěru přímo na postižené místo. Při aplikaci na větší plochu prostředek rovnoměrně rozetřeme. Po nanesení roztok rychle vyschne a vytvoří na povrchu pokožky bílý film.

Pokud se prostředek nanáší na místo, ze kterého se rychle setře (např. na chodidlo apod.), je možné místo po zaschnutí přípravku překrýt náplastí. Aplikace se provádí opakovaně, až se nechá zrohovatělá kůže bezbolestně odstranit.

Prostředek aplikujte pouze na postižené místo, aby nedocházelo k přesahu na okolní zdravou pokožku. I když nebudou po prvních aplikacích patrné známky působení, nezvyšujte množství ani četnost aplikovaného prostředku. Působení prostředku je individuální. První známky účinku mohou být pozorovatelné až po několika dnech.

Před odstraňováním svrchní vrstvy tkáně nejlépe ponořte místo na pět minut do teplé vody s přísadkou kuchyňské soli. Osušte, a pokud se tkáň samovolně neuvolní, opatrně obruste povrch např. pemzou. Pozor, při tomto postupu je možné přenést kožní onemocnění např. virového původu (bradavice), používejte proto vlastní hygienické pomůcky. Doporučená doba souvislého používání nemá přesáhnout 10 dní. Opakované použití na stejném místě je možné zahájit až po 5–7 dnech.

Upozornění:

- ⚠ Těhotné nebo kojící ženy by měly prostředek používat po konzultaci s odborným lékařem.
- ⚠ Nepoužívejte u dětí mladších 3 let, dětí mladší 15 let by měly prostředek používat pod dohledem dospělých.
- ⚠ Pacienti trpící cukrovkou by měli užívání prostředku konzultovat se svým ošetřujícím lékařem.
- ⚠ Osoby s citlivou pokožkou by měly prostředek používat s opatrností a jeho účinek nejprve ověřit na malém povrchu postiženého místa po dobu 2–3 dnů.
- ⚠ Nepoužívejte prostředek v případě alergií nebo precitlivlosti na některou z jeho složek.

Uchovávání:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte v původním obalu. Po použití těsně uzavřete a skladujte ve vstříelné poloze.



Varování:

- ⚠ Prostředek je hořlavý!
- ⚠ Při náhodném požití vypijte větší množství vody. Okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.
- ⚠ Při zasažení očí vypláchněte tekoucí vodou. Okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.
- ⚠ V případě neistoty o charakteru postiženého místa se poraďte se svým lékařem.
- ⚠ Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, obraťte se na svého lékaře.

Balení: Balení přípravku Kolodium forte obsahuje 10 ml roztoku naplněného ve hnědé skleněné lahvičce s uzávěrem a so špachtličkou. **Likvidace:** Nespoleboňovaný prostředek vraťte do lékárny. Čistý obalový materiál likvidujte do příslušného kontajneru na třídný odpad.









Neofyt spol. s r. o., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, Česká republika
 e-mail: phyteneo@phyteneo.cz

Údaje jsou uvedeny na obale.



Objem: 10 ml

Verze C-400-004-09-CZ-R15 ze dne 15. 1. 2022

 Omezení teploty.	 Číslo šarže.
 Chráňte před slunečním zářením.	 Použití do.
 Křehké, zacházejte opatrně.	 Výrobce.
 Referenční číslo.	 Výstraha.

SK **Kolodium forte**



Před použitím si pozorně prostudujte návod na použitie. Uchovajte si návod na použitie pro prípad ďalšieho použitia.

Účel určenia: Zdravotnícka pomôcka Kolodium forte je určená k humánnemu použitiu u pacientov s postihnutím kože (bradavice, kurie oka, zrohovatená koža) na šetrné odstránenie stvrdnutej, zrohovatej kože, kuřích ok a bradavíc tak, že spôsobuje odlúčenie vrchnej zrejlej, plne keratinizovanej vrstvy kože tzv. keratolytickým účinkom.

Zloženie: Alcohol, Acidum lacticum, Acidum salicylicum, Nitrocellulose, Chelidonium extractum fluidum, Thuya Occidentalis Extract, Ricinus Communis Oil, Terebinthinae etheroleum rectificatum, Ethyl Acetate.

Obsah léčivých látek v 1 g prostředku: Terebinthinae etheroleum rectificatum: 1,6 mg, Chelidonium extractum fluidum: 22 mg (přípravený z Chelidonium majus herba: 3,58 mg).

Zdravotnícka pomôcka neobsahuje deriváty ľudskej krvi.

Charakteristika: Kolodium forte je prípravok vo forme roztoku na lokálne použitie na postihnuté miesta na pokožke. Jedná sa o slabozelenú viskóznú kvapalinu s charakteristickou vôňou balenú vo fľaštičke s uzávěrom, súčasťou je aj špachtlička.

Kolodium forte obsahuje tieto liečivé látky:

Terebinthinae etheroleum rectificatum (terpentínová silica) je v prípravku použitá v množstve 0,16 % (w/w). Čištěná terpentínová silica z borovicovej pryskyřky obsahuje terpeny pineny, camphen a limonen. Působí antisepticky, podporuje prekrvenie tkaniva, zvyšuje resorpciu patologicky zmeneného tkaniva a podporuje tvorbu granulácie tkaniva.

Chelidonium extractum fluidum je etanolický extrakt vňate ľavstovníka väčšieho (Chelidonium majus). Je použitelný v množstve 2,2 % (w/w). Ľavstovníck obsahuje vysoké množstvo alkaloidov (chelidolin, chelidoxanthin) a v ľudovom liečitelstve sa používa ako prostriedok na odstránenie bradavíc. Alkaloidy majú pri vonkajšom použití antimikrobiálne a antimitotické účinky.

Dálej prípravok obsahuje **kolodium** (roztok nitrovanej celulózy v zmesi alkoholu), **kyselínu salicylovú a kyselínu mléčnú**. Tieto zložky zabezpečujú šetrné rozrušenie vrstvy tuhej, zväčšenej a hrubej kůže. Ďalšie zložky sú rastlinného pôvodu: **thuja, ricínový olej**. Thuja obsahuje rad monoterpénov (thujon, isothujon, fenchon, sabinen a alfa-pinen) a má tonizujúce účinky.

Indikácie: Prípravok sa používa na odstránenie stvrdnutej, zrohovatej kože, kuřích ok a bradavíc.

Kontraindikácie: Prípravok nemožno používať ak je pacient hypersenzitizovaný na ktorúkoľvek látku uvedenú v zložení prípravku. Prípravok sa nesmie aplikovať na zdravú pokožku a sliznice, na bradavice v oblasti genitálu a konečníka a na materské znamienka.

Interakcie: Interakcie prípravku nie sú známe.

Nežiaduce účinky: V ojedinělých prípadoch ako nežiadúci účinok môže vyskytnúť pálenie v mieste aplikácie, prípadne pri nanesení na zdravú pokožku môže dôjsť k jej podráždeniu.

Dávkovanie a spôsob aplikácie: Aplikuje sa podľa veľkosti postihnutého miesta, zvyščajne v množstve 1–3 kvapky 2–krát denne. Nanášame najľepšie špachtličkou na uzávěru přímo na postihnuté miesto. Pri aplikácii na väčšiu plochu prípravok rovnomerne rozotrieme. Po nanesení roztok rýchlo vyschne a vytvorí na povrchu pokožky biely film.

Ak sa prípravok nanáša na miesto, z ktorého sa rýchlo zotrie (napr. na chodidlo a pod.), je možné miesto po zaschnutí prípravku prekryť náplastou. Aplikácia sa prevádza opakovane, až sa nechá zrohovatělá koža bezbolestně odstranit.

Prípravok aplikujte len na postihnuté miesto, aby nedochádzalo k presahu na okolitú zdravú kožu. Ak keď nebudú po prvých aplikáciách viditeľné známky pôsobenia, nezvyšujte množstvo ani početnosť aplikovaného prípravku. Pôsobenie prípravku je individuálne. Prvé známky účinku môžu byť pozorovateľné až po niekoľkých dňoch.

Pred odstránením vrchnej vrstvy tkaniva je najlepšie ponoriť miesto na päť minút do teplej vody s prísadkou kuchynskej soli. Osušte, a pokiaľ sa tkanivo samovoľne neuvolní, opatrně obruste povrch např. pemzou. Pozor, při tomto postupe sa môžu prenášať kožné ochorenia např. vírusového pôvodu (bradavice), použíajte preto vlastné hygienické pomôcky. Odporúčaná doba súvislého používania nemá presiahnuť 10 dní. Opätovné použitie na rovnakom mieste je možné opakovať až po 5–7 dňoch.

Upozornenie:

- ⚠ Těhotné alebo dojčiacie ženy by mali prípravok používať po konzultácii s odborným lekárom.
- ⚠ Nepoužíajte u detí mladších ako 3 roky, deti mladšie ako 15 rokov by mali prípravok používať pod dohľadom dospelých.
- ⚠ Pacienti trpící cukrovkou by mali používanie prípravku konzultovať so svojim ošetřujícím lékařem.
- ⚠ Osoby s citlivou pokožkou by mali prípravok používať s opatrností a jeho účinek najskôr overiť na malom povrchu postihnutého miesta po dobu 2–3 dní.
- ⚠ Nepoužíajte prípravok v prípade alergií alebo precitlivosti na niektorú z jeho zložiek.

Uchovávanie:

Uchovávejte mimo dosahu dětí. Uchovávejte v původním obale. Po použití dobre uzavřete a skladujte vo zvislej polohe.



Varovanie:

- ⚠ Prípravok je hořlavý!
- ⚠ Při náhodnom použití vypijte väčšie množstvo vody. Okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.
- ⚠ Při zasažení očí vypláchněte tečoucí vodou. Okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.
- ⚠ V prípade neistoty o charaktere postihnutého miesta sa poraďte so svojim lékařem.
- ⚠ Pokiaľ si všimnete akýchkoľvek nežiadúcich účinkov, obráťte sa na svojho lekára.

Balenie: Balenie prípravku Kolodium forte obsahuje 10 ml roztoku naplněného v hneď sklenenej fľaštičke s uzávěrom a so špachtličkou. **Likvidácia:** Nespoleboňovaný prípravok vraťte do lekárne. Čistý obalový materiál zlikvidujte do príslušného kontajneru na třídný odpad.








Neofyt spol. s r. o., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, Česká republika
 e-mail: phyteneo@phyteneo.cz

Údaje sú uvedené na obale.



Objem: 10 ml

Verzia C-400-004-09-CZ-R15 zo dňa 15. 1. 2022

 Teplotný limit.	 Číslo šarže.
 Chráňte pred slnečným žiarením.	 Použitelné do.
 Křehké, zacházejte opatrně.	 Výrobca.
 Referenční číslo.	 Výstraha.



EN **Kolodium forte**

Carefully read the Instructions for Use before using. Keep the Instructions for possible future reference.

Intended purpose: The medical device Kolodium forte is intended for human use for patients with damaged skin (warts, corns, calloused skin) for the gentle removal of hardened, calloused skin, corns and warts by separating the top, mature, horny, fully keratinized layer of the skin by a keratolytic effect.

Ingredients: Alcohol, Acidum lacticum, Acidum salicylicum, Nitrocellulose, Chelidonii extractum fluidum, Thuya Occidentalis Extract, Ricinus Communis Oil, Terebinthinae etheroleum rectificatum, Ethyl Acetate.

Content of active substances in 1g of the device: Terebinthinae etheroleum rectificatum: 1.6 mg, Chelidonii extractum fluidum: 22 mg (prepared from Chelidonium majus herba: 3.58 mg).

The medical device does not contain human blood derivatives.

Characteristics: Kolodium forte is a device in the form of a solution for local use on damaged areas on the skin. It is a slightly green, viscous liquid with a characteristic odor, packaged in a small bottle with a cap, including a spatula.

Kolodium forte contains the following active substances:

Terebinthinae etheroleum rectificatum is used in the device in the amount of 0.16 % (w/w). Clean turpentine from pine resin contains terpenes pinene, camphene and limonene. It has antiseptic effects, supports blood circulation of the tissue, increases the resorption of pathologically altered tissue and supports the creation of granulation tissue.

Chelidonii extractum fluidum is an ethanolic celandine extract (Chelidonium majus). It is used in the amount of 2.2 % (w/w). Celandine contains a high amount of alkaloids (chelidonium, chelidoxanthin). In human medicine, it is used as a means for removing warts. When used externally, alkaloids have anti-microbial and anti-mycosis effects.

The device further contains **kolodium** (a nitrated solution of cellulose mixed with alcohol), **salicylic acid** and **lactic acid**. These ingredients ensure the gentle distraction of the solid, swollen, rough layer of the skin. The other ingredients are of plant origin: **thuja, castor oil**. Thuja contains a number of monoterpenes (thujone, iso thujone, fenchone, sabinene and alpha-pinene) and has tonic effects.

Indications: The device is used to remove hard, calloused skin, warts and corns.

Contraindications: The device cannot be used if the patient is hyper-sensitive to any of the ingredients mentioned. The device cannot be applied onto healthy skin, onto the mucous membrane, onto warts in the genital and rectum areas and onto birthmarks.

Interactions: Interactions of the device are not known.

Adverse Effects: In rare cases, undesirable side effects can include burning in the area of application or irritation can occur when applied onto healthy skin.

Dosage and Method of Application: Apply according to the size of the damaged area, usually 1-3 drops twice per day. It is best applied directly onto the damaged area, using the spatula on the cap. When applying onto a larger area, spread the device evenly. The solution dries quickly after application and creates a white film on the surface of the skin. If the device is being applied onto an area, from which it can quickly be smeared (for example, on the bottom of the foot, etc.), it is possible to cover the area with a band-aid after application. The application is repeated until the calloused skin can be painlessly removed.

Only apply the device onto damaged areas, avoiding contact with healthy skin. Even if the effects are not visible after the first applications, do not increase the quantity or the frequency of the applied device. Visible effects of the device are individual. The effects can be visible after several days.

Before removing the top layer of the tissue, it is best to submerge the area into warm saline water for five minutes beforehand. Dry off and if the tissue does not fall off on its own, carefully file the surface with, for example, pumice. Be careful, as it is possible to transfer a skin disease, for example, of a viral origin (wart). Therefore, use your own hygienic aids.

The recommended time of continuous use should not exceed 10 days. Repeated use on the same area is possible after 5-7 days.

Caution:

- ⚠ Pregnant and nursing women should only use the device after consulting a doctor.
- ⚠ Do not use on children younger than 3; children younger than 15 should use the device under adult supervision.
- ⚠ Patients with diabetes should consult the use of this device with their doctor.
- ⚠ Patients with sensitive skin should use the device carefully and first verify its effect on a small surface of the damaged area for a period of 2-3 days.
- ⚠ Do not use the device in the case of an allergy or a hyper-sensitivity to any of its ingredients.

Storage:

Keep out of the reach of children. Keep in its original package. Close tightly after use and store in a vertical position.

Warning:

- ⚠ The device is flammable!
- ⚠ If accidentally swallowed, drink a large quantity of water. Seek immediate medical attention.
- ⚠ If the device gets into your eyes, rinse eyes under running water. Seek immediate medical attention.
- ⚠ In case of uncertainty regarding the characteristics of the damaged area, consult your doctor.
- ⚠ If you notice any undesirable side effects, consult your doctor.

Packaging: The packaging of Kolodium forte contains a 10 ml solution filled into a small, brown, glass bottle with a cap and spatula. **Disposal:** Return the unused device back to the pharmacy. Dispose of the clean packaging material in the appropriate recycling bin.

Neofyt Ltd., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, Czech Republic
e-mail: phyteneo@phyteneo.cz

see packaging for information



Volume: 10 ml

Version C-400-004-09-CZ-R15 of January 15th, 2022

5°C - 25°C	Temperature limit.	LOT	Batch number.
	Protect from sunlight.		Use by date.
	Fragile, handle with care.		Manufacturer.
REF	Catalogue number.		Warning.

HU **Kolodium Forte**

Mielőtt a készítményt használná, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A későbbi használat érdekében a betegtájékoztatót őrizze meg.

Reddeletés: A bőrbeteg páciensek (szemölcs, tyűkszem, elszarusodott bőr) részére készült Kolodium forte orvostechnikai eszköz megkeményedett, elszarusodott bőr, tyűkszemek és szemölcsök kíméletes eltávolítására alkalmas a felső megvastagodott, elszarusodott, teljesen keratinizált hámréteg leválasztását biztosító ún. keratolitikus hatással.

Összetétel: Alcohol, Acidum lacticum, Acidum salicylicum, Nitrocellulose, Chelidonii extractum fluidum, Thuya Occidentalis Extract, Ricinus Communis Oil, Terebinthinae etheroleum rectificatum, Ethyl Acetate.

Hatóanyag tartalom 1 g készítményben: Terebinthinae etheroleum rectificatum: 1.6 mg, Chelidonii extractum fluidum: 22 mg (Chelidonium majus herbából készítve: 3.58 mg).

Az orvostechnikai eszköz nem tartalmaz emberi vér származékot.

Jellemzés: A Kolodium Forte készítmény egy oldat, amelyet külsőleg, az érintett bőrfelületen kell alkalmazni. Écszelő kupakkal ellátott palackba csomagolt, jellegzetes illatú, világoszöld viszkózus folyadék.

A Kolodium Forte a következő hatóanyagokat tartalmazza:

Terebinthinae etheroleum rectificatum (terpenolinolaj), a készítmény 0,16%-ban (w/w) tartalmazza. A tisztított fenyőgyantából készült terpenolinolaj pinen, camphen és limonen terpéneket tartalmaz. Antiszeptikus hatású, elősegíti a szövetek vérellátását, fokozza a kórosan megváltozott szövet felszívódását és támogatja a granulációs szövetképződést.

Chelidonii extractum fluidum vérehulló fecskefű (Chelidonium majus) szárából készült etanolos kivonat. A készítmény 2,2%-ban (w/w) tartalmazza. A népi gyógyászatban szemölcseltávolításra használt vérehulló fecskefű nagy mennyiségben tartalmaz alkaloidokat (chelidonium, chelidoxanthin). Az alkaloidok felső használat esetén antibakteriális és gombaölő hatásúak.

Továbbá a készítmény **kololdiumot** (alkohol keverékben nitrált cellulóz oldat), **szalicilsavat** és **tejsavat** tartalmaz. Mindezen összetevők elősegítik a megkeményedett, megvastagodott bőr eltávolítását. További növényi eredetű összetevők: **tuja, ricínuszolaj**. A tonizáló hatású tuja számos monoterpént (thujon, isothujon, fenchon, sabinen és alfa-pinén) tartalmaz.

Javallat: A készítmény megkeményedett, elszarusodott bőr, tyűkszemek és a szemölcsök eltávolítására szolgál.

Ellenjavallat: A készítmény nem alkalmazható, ha a páciens az összetételéül feltüntetett anyagok közül bármelyikre allergiás. A készítmény nem alkalmazható egészséges bőrre és nyálkahártyára, illetve a nemi szervek és a végbél közelében található szemölcsökre, továbbá anyajegyekre sem.

Kölcsönhatások: A készítmény kölcsönhatásai nem ismertek.

Nem kívánatos mellékhatások: Egyedülálló esetekben nem kívánatos mellékhatásként az alkalmazás helyén fellépő égető érzés jelentkezhet, illetve egészséges bőrre történő felvitel esetén irritáció léphet fel.

Adagolás és alkalmazás módja: Az érintett terület mérete függvényében, általában 1-3 csepp naponta kétszer. A kupakon található ecsetelővel vigye fel közvetlenül az érintett felületre. Nagyobb felületen alkalmazva egyenletesen kenje szét a készítményt. Az oldat felvitelét követően az megszárad, és fehér bevonatot képez a felületen.

Ha a készítményt olyan felületre viszi fel, amelyről gyorsan letörődik (pl. lábfej, stb.) az oldat megszáradását követően a felület sebtappalaszal fedhető le. Ismétellen kell alkalmazni, amíg az elszarusodott bőr fájdalommentesen el nem távolítható. A készítményt kizárólag az érintett területre vigye fel, ügyeljen rá, hogy a környező egészséges bőrre ne kerüljön. Ha az első alkalmazásokat követően még nem is látható a hatás, ne növelje a készítmény kezelésenként alkalmazott mennyiségét, se a kezelések gyakoriságát. A készítmény hatása egyénenként változó. Elképzelhető, hogy a kifejtett hatás első jelei csak néhány nap múlva jelentkeznek.

A felső szövetréteg eltávolítása előtt merítse az érintett felületet 10 perc asztali sótt tartalmazó meleg vízbe. Szárássa meg, és ha a szövet nem válik le spontán, óvatosan reszelje le a felületét, például talpárpesztelővel. Figyelem, az emíltett eljárás során bőrbetegségeket pl. vírusos eredetű szemölcs átvitelére kerülhet sor, ezért csak a saját személyi tisztálkodási eszközeit használja!

A folyamatos használat javasolt időtartama nem haladhatja meg a 10 napot. Ismételt alkalmazásra ugyanazon a helyen, csak 5-7 nap elteltével lehetséges.

Figyelmeztetés:

- ⚠ Terhes vagy szoptató nők a készítményt kizárólag szakorvossal folytatott konzultációt követően használhatják.
- ⚠ 3 év alatti gyermek esetében ne használja, 15 évnél fiatalabb személyek a készítményt felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- ⚠ Ukorbetegségben szenvedőknek a készítmény alkalmazását megelőzően a kezelőorvossal kell konzultálni.
- ⚠ Érzékeny bőri személyek a készítmény fokozott körültekintéssel használhatják és a hatását először az érintett felület kis részének 2-3 napig tartó kezelésével ellenőrizhetik le.
- ⚠ Ne használjuk a készítményt bármelyik összetevővel szembeni allergia vagy túlérzékenység esetén.

Tárolás:

Gyermekek kezébe nem kerülhet. Eredeti csomagolásában tárolja. Használat után szorosan zárja vissza és függőleges helyzetben tárolja.

Övintézkedés:

- ⚠ Gyűlékony készítmény!
- ⚠ Véletlenszerű lenyelés esetén igyon nagyobb mennyiségű vizet. Haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- ⚠ Szembe jutás esetén folyó vízzel öblítse ki. Haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- ⚠ Ha az érintett felület jellegét illetően kétségei támadnának, konzultáljon kezelőorvosával.
- ⚠ Ha bármilyen nem kívánatos mellékhatást észlel, forduljon a kezelőorvosához.

Kiszárazás: A Kolodium Forte készítmény csomagolása 10 ml oldatot tartalmazó barna palack ecsetelős kupakkal. **Ártalmatlanítás:** A fel nem használt készítményt gyógyszerierőben adja le. A tiszta csomagolóanyagot a megfelelő szelektív hulladékgyűjtő konténerbe dobja.

Neofyt spol. s r. o., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, Cseh Köztársaság
e-mail: phyteneo@phyteneo.cz

az adatok a csomagoláson vannak feltüntetve



Úrtartalom: 10 ml

C-400-004-09-CZ-R15 verzió, 2022. 1. 15.

5°C - 25°C	Hőmérsékleti határ.	LOT	A tétel száma.
	Védje napfénytől.		Felhasználható.
	Törékeny, óvatosan kezelje.		Gyártó.
REF	Referenciaszám.		Figyelmeztetés.